

Data de implementação e rodadas adicionais
2010

Cobertura da embalagem

Incluindo a borda, as advertências de saúde precisam cobrir 33% da frente e 33% do verso das embalagens. No geral, 33% do espaço da embalagem é reservado para advertências de saúde.

Frequência de rotação e histórico

Seis advertências são usadas nas embalagens de cigarros.

Restrições sobre informações enganosas

Não especificado.

ADVERTÊNCIAS

2010



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ ҮР УДМЫГ ХӨНӨӨНӨ.
Цусан хангамж буурч хүчилтөрөгч, тэжээл дутагдсанаас ургийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг.



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ УРУУЛ, АМНЫ ХӨНДИЙН ХАВДАР, БУЙЛНЫ ӨВЧИН, ШҮДГҮЙДЭХ ШАЛТГААН БОЛНО.
Буйл үрэвсэж шүд сулран шүдгүйднэ.



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭС ҮҮСГЭНЭ.
Цусны хүчилтөрөгчийн хангамж багассанаас эрхтнүүдэд тэжээл дутагдаж зүрх, тархины шигдээс үүсгэдэг.

Тамхичны зүрх Эрүүл зүрх



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ ЧИХРИЙН ШИЖИНГ ХҮНДРҮҮЛНЭ.
Захын болон төвийн судасны бөглөрлийг үүсгэж, хөл тайрах, хараагүй болох эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ.



АНХААРУУЛГА
УУШГИНЫ ХАВДРЫН 90% НЬ ТАМХИНААС ҮҮДЭЛТЭЙ.
Уушгины хавдартай 10 хүн тутмын 9 нь тамхичин байдаг.

Эрүүл уушги Тамхичны уушги



АНХААРУУЛГА
ТАМХИ БЭЛГИЙН СУЛРАЛ ҮҮСГЭНЭ.
Бэлэг эрхтний цусан хангамжийг бууруулдаг.